

Abstract of CN A 1309982

The oral hemostatic Chinese medicine consists of *Astragalus membranaceus* 24-36 wt%, Chinese angelica root 10-20 wt%, prepared remannia rhizome 10-20 wt%, fish swim-bladder gelatin 8-36 wt%, Taiwan beautyberry leaf 6-12 wt% and honey fried licorice 6-12 wt%. It is used mainly for treating intractable functional womb hemorrhage, and other hemorrhage incapable of being cured with conventional hemostatic. It has obvious cure effect, no toxic side effect and no relapse.

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl.

A61K 35/78

A61P 7/04

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 00103088.4

[43] 公开日 2001 年 8 月 29 日

[11] 公开号 CN 1309982A

[22] 申请日 2000.2.24 [21] 申请号 00103088.4

[71] 申请人 孙学立

地址 100081 北京市 2417 信箱 28 分箱

[72] 发明人 孙学立

权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图页数 0 页

[54] 发明名称 一种口服止血中药

[57] 摘要

一种口服止血中药,它由以下组分按重量百分比组成:黄芩 24-36;当归 10-20;熟地 10-20;鱼腥胶 8-36;紫珠草 6-12;炙甘草 6-12;主要用于治疗严重的顽固性的子宫功能性出血,和用常规止血药剂治疗效果不明显的各种出血症,它完全由中药制成,无毒副作用,治疗效果显著,治愈后不会复发。

ISSN 1008-4274

知识产权出版社出版


权 利 要 求 书

1、一种口服止血中药，其特征是：它由以下组分按重量百分比组成：

黄芪	24-36	当归	10-20	熟地	10-20
鱼鳔胶	8-36	紫珠草	6-12	炙甘草	6-12

2、根据权利要求 1 所述的口服止血中药，其特征是，它由以下步骤制成：

- (1) 配料，按配方将各组分配好待用，
- (2) 将配料中除鱼鳔胶外的各组分配放在药锅内煮好，过滤去渣，
- (3) 将鱼鳔切割成块，与已煮好的上述药液混合，用高温高压煮沸 1-2 小时，至鱼鳔胶溶解，使药液成胶状物，
- (4) 将上述胶状物冷却晾干成薄层物，再切成小块，拌以滑石粉防粘，然后用文火炒，使成珠状物，
- (5) 将上述珠状物冷却干燥后粉碎成细末，
- (6) 将上述细末与糊精混合后烘干成制剂，
- (7) 将该制剂分装为制品。



一种口服止血中药

本发明涉及一种止血药，具体是一种口服止血中药。

在止血药剂中，有许多种制剂，例如止血敏、维生素 K、安络血、宫血宁等，这些药剂为常规治疗用药或辅助治疗用药，通用性较强，但药效不够明显。疗程较长疗效较慢，当患者病情轻时，可取得治疗效果，当患者病情严重时，则不易取得根本治疗的效果，某些由化学物质合成的西药有一定治疗效果，但西药往往毒副作用较大，会刺激胃部不适，且价格较贵。

本发明的目的是提供一种口服止血中药，主要用于治疗严重顽固性的功能性子宫出血，和用于治疗用常规止血药效果不明显的各种出血症，它完全由中药制成，无毒副作用。

本发明的目的是按如下技术方案实现的。一种口服止血中药，其特征是它由以下组分按重量百分比组成：

黄芪	24-36	当归	10-20	熟地	10-20
鱼鳔胶	8-36	紫珠草	6-12	炙甘草	6-12

它由以下步序制成：

- (1) 配料，按配方将各组分配好待用；
- (2) 将配料中除鱼鳔胶外的各组分配放在药锅内煮好，过滤去渣；
- (3) 将鱼鳔切割成块，与已煮好的上述药液混合，用高温高压煮沸 1-2 小时，至鱼鳔胶溶解，使药液成胶状物；
- (4) 将上述胶状物冷却晾干成薄层物，再切成小块，拌以滑石粉防粘，然后用文火炒，使成珠状物；
- (5) 将上述珠状物冷却干燥后粉碎成细末；
- (6) 将上述细末与糊精混合后烘干成制剂；
- (7) 将该制剂分装为制品。

本发明以鱼鳔胶为止血主药，其功能为清热止血、涩漏收敛、养血、凉血、滋补筋脉的主要作用，紫珠草功能为止血、凉血做为辅药，以黄芪、当归、熟地进行补中益气、补血、行血、理血，滋阴补虚、润燥和营治疗，炙甘草有益气养血，并和诸药之功能。将上述各中药组分配伍而成，以达到止血、补血的主要功能，其药专力强，治疗目标单一，特别是对妇科子宫出血等出血性疾病的疗效显著。

下面以实施例做具体介绍。

实施例 1 制作冲剂。

一、配方：取下列组分（按重量百分比）：

黄芪	30	当归	15	熟地	15
鱼鳔胶	20	紫珠草	10	炙甘草	10

二制作：

- (1) 配料，按上述配方将各组分挑去杂质，分别备好待用，
- (2) 将配料中除鱼鳔胶外的 5 种组分放在锅中煮沸，改文火煮 1.5 小时，过滤去除药渣，
- (3) 将鱼鳔切割成小块，与上述已过滤的药液混合，在压力为 0.15 到 0.2MPa，150℃下煮沸 1.5 小时，至鱼鳔胶溶解在药液中，使药液成胶状物，
- (4) 将上述胶状物冷却晾干成薄层，再切成小块，拌以滑石粉防粘，然后用文火炒，至成珠状物，
- (5) 将上述珠状物冷却干燥后，粉碎成细末，
- (6) 将上述细末与糊精按重量 1：1 混合后，烘干粉碎制成冲剂，
- (7) 将该制剂分袋包装为成品。

实施例 2 制作丸剂

一、配方：取下列组分（按重量百分比）：

黄芪	32	当归	20	熟地	20
鱼鳔胶	8	紫珠草	10	炙甘草	10

二制作:



其制作步序除(6)与实施例1不同外,其余步序均相同,步序(6)为将上述细末与糊精混合加水制成丸,干燥成丸剂。

综上所述,本发明止血中药,以鱼鳔胶为止血主药,以黄芪、紫珠草、当归、熟地为辅,以炙甘草调和诸药组分,将上述各组分中药材配伍而成,其治疗目的单一,药专力强,用于治疗出血症,特别适于治疗妇女子宫出血等症状。

下面介绍临床应用情况。本药剂曾在临床上在未公开配方情况下使用,共治疗各类妇女子宫功能性出血又称崩漏,共30例,主要的对比药物为宫血宁、安络血、止血敏、避孕药、妇康片,在上述对比药物不见效的情况下,服用本制剂,结果100%有效,止血率达98%。以下列典型病例加以说明:

病例1、杨××女41岁,自述月经失调,量多,已3年,98年2月6日初诊。患者自94年宫内放环后,月经量过多,去环后月经失调,量仍多,月经周期10-23天,量多有血块,曾用宫血宁、安络血、避孕药治疗无效。1月2日来潮量多行经10天于12日基本干净,这次月经是2月1日来潮量多4-5天,有大血块,伴有头晕心慌,全身乏力。检查RBC $3.36 \times 10^{12}/L$,HGB96g/L。临床初步诊断,西医:1、功能性子宫出血,2、继发性贫血,中医:崩漏。征得患者同意,给予本发明药止血冲剂,每次1袋,每日2次。

2月9日复诊。患者自述服药后子宫出血明显减少,服药3天出血基本干净。

3月6日回诊,自述3月1日月经按期来潮,量较前明显减少,行经数天干净,未再复发。

病例2,张××女43岁,自述月经失调3年,子宫出血50余天。98年1月24日初诊。

患者3年来月经失调无规律,有时闭经,有时子宫出血不干净,量时

多时少，做诊断性测定，病理报告为“子宫内膜增生过长”服用过止血敏、妇康片等药，效果不佳。12月3日，子宫出血50余天，至今未净，伴头晕、全身乏力，失眠等症状。

检查：RBC $3.67 \times 10^{12}/l$, HGB7.4g/l 临床印象，西医：1、功能性子宫出血，2、继发性贫血。中医：崩漏。

征得患者同意，给予本发明中药止血冲剂，每日2次，每次1袋。

1月27日复诊。服上述药4天，血量明显减少，经血色变浅，查垫纸可见少许血性分泌物。

经服本发明止血药止血冲剂2天后，血干净。

此外应用本药剂曾对肺癌性出血、支气管扩张性出血等症应用于临床治疗，亦有好的止血效果，现正在进一步的研究应用中。